

SOUTHWEST VEIN & LEG CENTER

THE TEAM DIFFERENCE

Instrucciones de tratamiento con láser post-endovenoso

- Tendrá medias de compresión en su pierna operativa cuando salga de la oficina. Dormir en esta media durante las primeras 24 horas y usarlo durante al menos los próximos 6 días mientras está despierto.
- Quizás tenga molestias después del procedimiento. Es normal sentir una sensación de apretar o tirar en la pierna después del procedimiento. Esta incomodidad generalmente se puede manejar con analgésicos sin receta como Tylenol o Motrin. Algunos pacientes consideran que es útil tomar un día o dos fuera del trabajo, aunque esperamos que usted pueda reanudar todas sus actividades antes del procedimiento (incluyendo trabajo) al día siguiente, si es necesario.
- Es importante mantenerse en movimiento y mantener un nivel normal de actividad. Caminar dos veces al día durante 20 minutos es alentado y promueve la curación.
- Como con cualquier procedimiento invasivo, pueden ocurrir problemas. Si usted desarrolla fiebre aguda (más de 100F o 38C) o dolor o hinchazón grave o que empeora, comuníquese con nuestra oficina al 817-235-0769 o al 817-294-0934 después de horas.
- Una exploración de seguimiento es necesaria después del procedimiento. Por favor traiga sus medias de compresión a todas las citas.